Una revisión de la entidad “Desorden linfoproliferativo de células pequeñas y medianas T CD4+ primario cutáneo (DLCPM-PC)”.
Discusión de dos casos clínicos.

- García-Molina F. (1), Pastor-Quirante, F. (1), Gil-Griñan A. (1), Ortiz-Reina, S. (2), Martínez Díaz, F. (1)
 - (1): Hospital General Universitario Reina Sofía.
 - 2): Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena.

Historia de la entidad.

- En los 90's concepto de entidad → Sistema de clasificación de *Kiel*.
 - Linfomas T cutáneos primarios que no cumplían criterios de Micosis Fungoide o Síndrome de Sezary.

Infiltrados linfoides de células T pleomórficas pequeñas mejor pronóstico que las grandes.

Los casos con tamaño mediano, células T pleomórfico no estaban clasificadas consistentemente. A veces se englobaban con las de pequeño tamaño.

CD8+ peor pronostico (excluyeron)

1995 Friedmann y colegas lo describen por primera vez.

SE CONSIDERO ENTIDA PROVISIONAL EN OMS 2008 (4º Edición). COMO LINFOMA PROVISIONAL

LCPM-PC

Muchos expertos permiten variantes CD8+

Historia de la entidad.

- Por otra parte.....
 - Se estudiaron los pseudolinfomas cutáneos o hiperplasias linfoides reactivos.
Curso clínico benigno
No existe pérdida de CD2, CD3 o CD5 y no hay Clonalidad T
UNOS POCOS..... Pérdida de marcadores T y población T clonal. (review Ploysangam et al).
Distinción entre pseudolinfoma T y LCPM-PC no está clara.
- Hoy....
 - Debido precisamente a que el curso clínico benigno semejante al pseudolinfoma de células T → llamamos desorden linfoproliferativo (Revisión de la 4ª Edición de WHO, 2017).

WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues

Steven H. Swerdlow, Elias Campo, Nancy Lee Harris, Elaine S. Jaffe, Stefano A. Pileri, Harald Stein, Jürgen Thiele, Daniel A. Arber, Robert P. Hasserjian, Michelle M. Le Beau, Attilio Orazi, Rainer Siebert

14 Mature T- and NK-cell neoplasms	345
T-cell prolymphocytic leukaemia	346
T-cell large granular lymphocytic leukaemia	348
Chronic lymphoproliferative disorder of NK cells	351
Aggressive NK-cell leukaemia	353
EBV-positive T-cell and NK-cell lymphoproliferative diseases of childhood	355
Systemic EBV+ T-cell lymphoma of childhood	355
Chronic active EBV infection of T- and NK-cell type, systemic form	358
Hydroa vacciniforme-like lymphoproliferative disorder	360
Severe mosquito bite allergy	362
Adult T-cell leukaemia/lymphoma	363
Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type	368
Intestinal T-cell lymphoma	372
Enteropathy-associated T-cell lymphoma	372
Monomorphic epitheliotropic intestinal T-cell lymphoma	377
Intestinal T-cell lymphoma, NOS	378
Indolent T-cell lymphoproliferative disorder of the gastrointestinal tract	379
Monoclonal T-cell lymphoma	381
Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma	383
Mycosis fungoides	385
Sézary syndrome	390
Primary cutaneous CD30-positive T-cell lymphoproliferative disorders	392
Lymphomatoid papulosis	392
Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma	395
Primary cutaneous peripheral T-cell lymphomas, rare subtypes	397
Introduction	397
Primary cutaneous gamma delta T-cell lymphoma	397
Primary cutaneous CD8-positive aggressive epidermotropic cytotoxic T-cell lymphoma	399
Primary cutaneous acral CD8-positive T-cell lymphoma	400
Primary cutaneous CD4+ small/medium T-cell lymphoproliferative disorder	401
Peripheral T-cell lymphoma, NOS	403
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma and other nodal lymphomas of T follicular helper (TFH) cell origin	407
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma	408
Follicular T-cell lymphoma	411
Nodal peripheral T-cell lymphoma with TFH phenotype	412
Anaplastic large cell lymphoma, ALK-positive	413
Anaplastic large cell lymphoma, ALK-negative	418
Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma	421

NADA CLARO.

- Pese a lo dicho....no hay consenso sobre que este desorden linfoproliferativo tenga una **existencia, definición y clasificación** como entidad propia.
- **Solapamiento con:**
 - Pseudolinfoma de células T, Foliculitis pseudolinfomatosa, hiperplasia linfoide cutánea, pápula linfomatoide solitaria, linfoma de células T periféricas primario cutáneo, Hiperplasia de células T atípicas monoclonales, Nódulo de significado incierto pleomórfico de célula T.

OJO!!! Casos agresivos cutáneos de Linfoma T periférico, NOS indistinguibles de DLCPM-PC
Algunos casos informados como DLCPM-PC pueden ser
Linfoma de células T perifético, NOS

Cerroni 2017: En el estado actual del conocimiento no está claro si el DLCPM-PC sea un tipo de linfoma cutáneo de células T, un precursor de linfoma o una condición reactiva totalmente benigna (pseudolinfoma)

Desorden linfoproliferativo primario cutáneo de células T CD4+ pequeñas y medianas

- 2% de todos los linfomas cutáneos T.
- Localización: Placas o nódulos (en cabeza, cuello y tronco superior).
- Clínica: Crecimiento lento de la lesión. Normal solitaria. Descritos múltiples lesiones (podrían ser linfoma de célula T periférico, NOS).
- Predominio de células CD4+ pleomórficas.
- Curso clínico benigno semejante al pseudolinfoma de células T por eso llamamos desorden linfoproliferativo
- Casos más agresivos (lesiones cutáneas extendidas/>30% de células T pleomórficas y alto Ki67) → mejor dentro de Linfoma T periférico..

Desorden linfoproliferativo primario cutáneo de células T CD4+ pequeñas y medianas

- **Microscopía:**

- Infiltrado denso, difuso y nodular en dermis de linfocitos CD4+ pequeños y medianos pleomórficos con tendencia a infiltrar subcutis
- Epidermotropismo puede estar (focalmente). Si conspicuo → ¿Micosis Fungoide?
- Células pleomórficas T, pequeñas y medianas.++
- Células grandes (< 30%)
- **Las CD4+ atípicas mezcladas con:**
 - *Reactivas pequeñas CD8+*
 - *Células plasmáticas*
 - *Histiocitos (incluso células gigantes multinucleadas).*
 - *Eosinófilos.*

Desorden linfoproliferativo primario cutáneo de células T CD4+ pequeñas y medianas

- **Inmunofenotipo:**

- Fenotipo CD3+, CD4+, CD8-, CD30- (o unas pocas células)
- No suele perder antígenos panT (excepto CD7).
- Ausencia de expresión de proteínas citotóxicas.
- CD10 (-)
- Ki67 5-20%.

- Las células CD4+ expresan:
 - PD1, Bcl6 (variable) y CXCL18 sugiriendo fenotipo TH

- **Pronóstico y factores predictivos:**

- Pronóstico excelente.
- Esteroides intralesionales y excisión quirúrgica. Remisión espontánea tras biopsia.
- Recurrencias locales son raras.
- Peor pronóstico en múltiples y en piernas (excepcionales).

Desorden linfoproliferativo primario cutáneo de células T CD4+ pequeñas y medianas

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.

-Linfoma de célula T CD8+ cutáneo primario acral es indistinguible de DLCPM-CP a veces. El primero más infiltrado monomorfo, CD8+ y proteínas citotóxicas.

-Linfoma células T periférico cutáneo, NOS. Múltiples lesiones y aberraciones cromosómicas profundas
Marcadores citotóxicos.

-Micosis Fungoide: Si muchas células reactivas en contra de MF.

-Condiciones reactivas: Imposible de distinguir en muchos casos.

Caso 1

- CASO 1: Paciente varón de 68 años que acudió a consulta hace 4 años por presentar lesión en el antebrazo derecho que ha ido aumentando de tamaño y que en ocasiones le produce algo de picor. E.F.: placa eritematosa, algo sobreelevada, de superficie lisa y brillante, de 5 cm de tamaño, en antebrazo derecho.

IF:
CD3++
CD79a/CD20:+/-
CD30:-
CD4/CD8:alto
Ki-67: 15%
Reord. TCR:+

- IF:
- CD3++
- CD79a/CD20:+/-
- CD30:-
- CD4/CD8:alto
- Ki-67: 15%
- Reord. TCR:+

DESORDEN LINFOPROLIFERATIVO CUTÁNEO
CD4+ DE CÉLULAS T PEQUEÑAS Y MEDIANAS.

Caso 2

- CASO 2: Paciente varón de 40 con placa de 1.2 cm en cuero cabelludo de consistencia blanda y rosada de crecimiento rápido.

CD4

CD8

CD8

CD20

Bcl-6

Bcl-2

- IF: (+) CD20, CD3, CD4, CD5, CD2, BcL6 y PD1
- (-) CD10, CD8, EBER
- Ki 67: 45-50%

DESORDEN LINFOPROLIFERATIVO CUTÁNEO
CD4+ DE CÉLULAS T PEQUEÑAS Y MEDIANAS.

REORDENAMIENTO TCRBeta en Tejido: Presencia de pico clonal de 306b pb en la región DJ del gen RCR-beta.

EXTIRPACIÓN DE LA LESION

EXTIRPACIÓN DE LA LESION

Aumenta CD8
Disminuye CD4
CD 20 aumenta focalmente

EXTIRPACIÓN DE LA LESION

Bcl2 Bcl6 parecidos
CD30 marca muy pocas células

EXTIRPACIÓN DE LA LESION

Ki67 bajo (más bajo que el punch)
CD30 marca muy pocas células

EXTIRPACIÓN DE LA LESION

- NO sabemos el porque del cambio inmunofenotípico CD4/CD8/CD20
- Mandamos fuera y mantuvieron el diagnóstico.
- Hay literatura de remisión de la lesión tras la biopsia de la misma.

¿podrían ser los cambios del sistema inmune producto de la biopsia que se hizo?

RESUMIENDO...

- **DESORDEN LINFOPROLIFERATIVO DE CÉLULAS T PEQUEÑAS Y MEDIANAS T CD4+ PRIMARIO CUTÁNEO.**
 - -Células T pleomórficas de tamaño pequeño, mediano y lesión cutánea solitaria.
 - -Mismas características clínico-patológicas y curso benigno que los pseudolinfomas de células T. Por esto es llamado “desorden” no linfoma
 - -Si Ki alto o más del 30 % de células grandes mejor linfomas de células T periféricos (caso 2?). Epidermotropismo muy focal.
 - -IF: +++: CD3, CD4 (PD1+, BCL6+-, CXCL13+→SUGIERE THELPER), ---:CD8, CD30, CD10. Ki-67: 5-20%.
 - Excelente pronóstico. El rápido crecimiento en el caso 2—>Ki67 y Rico en B??

Cerroni 2017: En el estado actual del conocimiento no está claro si el DLCPM-PC sea un tipo de linfoma cutáneo de células T, un precursor de linfoma o una condición reactiva totalmente benigna (pseudolinfoma)

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Francisco Martinez...por ayudarme a sacar la biopsia

A mi Jefe el Dr. Francisco Pastor

Al Dr. Sebastian Ortiz por cederme la primera biopsia.

A la Dra. Nieves por cederme otro caso.

LLAMAMIENTO A RECOLECCIÓN DE CASOS